

Niveau	Domaine	Module	Outil numérique	Fichier
Seconde Bac pro	Statistiques- Probabilités	Statistiques à une variable	GeoGebra	<i>dilatation et matériaux.ggb</i>

ÉNONCÉ ÉLÈVE

Document 1 :

Quand la température d'un matériau change, les dimensions de ce dernier changent. Concernant un métal de forme allongée, si on le chauffe, sa dilatation sera surtout visible dans le sens de la longueur. C'est la dilatation linéaire.

Le cuivre est couramment utilisé dans les systèmes de plomberie et de chauffage, en raison de sa résistance à la corrosion. La dilatation linéaire du cuivre est prise en compte lors de l'installation des tuyaux afin de prévenir les problèmes liés à la dilatation thermique.

L'aluminium est utilisé dans la construction de structures légères telles que les cadres de fenêtres, les portes et les façades de bâtiments. La dilatation linéaire de l'aluminium est prise en compte lors de la conception et de l'installation de ces structures afin d'éviter les problèmes de contraintes et de déformation dus aux variations de température.

Document 2 :

En statistique, une donnée aberrante est une valeur ou une observation qui est « distante » des autres observations effectuées sur le même phénomène, c'est-à-dire qu'elle contraste grandement avec les valeurs « normalement » mesurées.

En TP de physique, Alice et Ethan ont mesuré la longueur d'un fil à différentes températures.

Alice a réalisé les mesures suivantes avec un fil de cuivre :

Température (°C)	0	20	40	60	80	100	120	140
Longueur du fil (m)	41,943	41,957	41,971	41,986	42,000	42,014	42,029	42,043

Ethan a réalisé les mesures suivantes avec un fil d'aluminium :

Température (°C)	0	20	40	60	80	100	120	140
Longueur du fil (m)	41,923	41,942	41,961	41,981	42,000	42,019	42,039	42,158

L'objectif de cet exercice est d'étudier les séries statistiques formées par les longueurs de fils mesurées par Alice et Ethan et de porter un regard critique sur ces mesures.

PARTIE A : Exploitation des mesures d'Alice et d'Ethan.

1) Construire les diagrammes en boîtes à moustaches correspondant aux longueurs relevées par Alice et Ethan en suivant les étapes suivantes.

- a. Ouvrir le fichier GeoGebra nommé « *dilatation et matériaux.ggb* ».
 b. Suivre le protocole ci-après.

①	Sélectionner l'ensemble des longueurs de fils de cuivre.
②	Appuyer sur la touche « Ctrl ».
③	Tout en maintenant la touche « Ctrl » appuyée, sélectionner les longueurs de fils d'aluminium.
④	Dans le menu en haut, choisir l'icône 
⑤	Cliquer sur ANALYSE.

2) Visualiser les deux boîtes à moustaches, les comparer et cocher la bonne réponse pour chaque question.

a) L'écart interquartile des longueurs mesurées pour l'aluminium est :

- plus petit
 sensiblement le même
 plus grand
- } que celui des longueurs mesurées pour le cuivre.

b) Quand on chauffe les fils, la dilatation linéaire pour l'aluminium est :

- plus petite
 sensiblement la même
 plus grande
- } que la dilatation linéaire du cuivre.

3) Cliquer sur l'icône  et compléter les lignes « Mesures d'Alice » et « Mesures d'Ethan » du tableau ci-après avec les valeurs des indicateurs statistiques.

Indicateurs (en m)	min	1 ^{er} quartile	Médiane	3 ^{ème} quartile	Max	moyenne \bar{x}	Écart-type σ
Mesures d'Alice							
Mesures d'Ethan							

PARTIE B : Regard critique sur les mesures d'Ethan.

Sur le fichier GeoGebra on remarque qu'une valeur aberrante est observée. Elle est marquée par une croix en dehors de la boîte à moustaches.

4) Rechercher dans les tableaux de mesures d'Alice et d'Ethan la valeur correspondant à cette valeur aberrante et l'entourer. Émettre une hypothèse de ce qui peut en être la cause et qui pourrait expliquer cette valeur notée aberrante.

Ethan refait une mesure à 140°C. Il note la valeur : 42,058 m.

5) Modifier la valeur dans le tableau correspondant sur le fichier GeoGebra.

6) Observer les boîtes à moustaches obtenues et indiquer si les comparaisons restent les mêmes qu'à la question 2).

7) Compléter la ligne « Nouvelle série de mesures d'Ethan » du tableau suivant avec les nouvelles valeurs des indicateurs statistiques.

Indicateurs (en m)	min	1 ^{er} quartile	Médiane	3 ^{ème} quartile	Max	moyenne \bar{x}	Écart-type σ
Nouvelle série de mesures d'Ethan							

8) Finalement, indiquer les indicateurs statistiques qui changent quand on rectifie la valeur aberrante. Est-ce que cela était prévisible ? Justifier.